

Aufgabe 11.1 Asymmetrisches Zhoukovski-Profil

Im Skript wurde das symmetrische Zhoukovski-Profil betrachtet, welches durch die Zhoukovski-Transformation eines Kreises durch die angehende Hinterkante (singulärer Punkt) mit um $\delta \in \mathbb{R}$ verschobenen Mittelpunkt entsteht. In dieser Aufgabe sollen nun *asymmetrische* Profile untersucht werden.


- a) Betrachte das Bild eines Kreises durch den singulären Punkt $z_1 = R$ auf der reellen Achse mit komplexem Verschiebungsvektor $\delta = \delta_x + i\delta_y \in \mathbb{C}$ unter der Zhoukovski-Transformation

$$\tilde{z} = z + \frac{R^2}{z}.$$

Untersuche zuerst rein imaginäre Verschiebungsvektoren $\delta = i\delta_y$ und parametrisiere das Profil mittels Polarkoordinaten, $z = re^{i\theta}$. Finde die entsprechende Parametrisierung für \tilde{z} aus der Transformation. Zeige, dass das Bild des verschobenen Kreises für rein imaginäres δ dargestellt werden kann durch

$$\tilde{x}^2 + (\tilde{y} + 2R \cot 2\beta)^2 = (2R \csc 2\beta)^2, \quad \cos \beta = R/\rho, \quad \rho = |R - \delta|.$$

Welches Verhältnis besteht zwischen den Winkeln β und β' ?



- b) Zeige, dass die Kutta-Bedingung $v_{\parallel}(0) < \infty$ (v_{\parallel} : Tangentialgeschwindigkeit) folgende Zirkulation verlangt:

$$\Gamma = -4\pi v^{\infty} |R - \delta| \sin(\alpha + \beta),$$

mit $\delta = \delta_x + i\delta_y \in \mathbb{C}$. Untersuche dazu das komplexe Geschwindigkeitspotential $\Phi(z)$, welches sich analog zu Gl. 9.62 im Skript (symmetrischer Fall) mittels der Parametrisierung aus a) herleiten lässt.

- c) Welchen Einfluss hat eine asymmetrische Profilierung auf den Auftrieb? Warum kann ein solches Profil vorteilhaft sein?

Aufgabe 11.2 Vortex - Diffusion

- a) Zeige, dass in in einem inkompressiblen viskosen Fluidum die zeitliche Entwicklung der Vortizität $\vec{\zeta} \equiv \vec{\nabla} \times \vec{v}$ durch

$$\frac{D\vec{\zeta}}{Dt} \equiv \frac{\partial \vec{\zeta}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{\zeta} = (\vec{\zeta} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} + \nu \nabla^2 \vec{\zeta}$$

beschrieben wird, wobei $\nu = \frac{\eta}{\rho}$.

- b) Betrachte den Fall einer axialsymmetrischen Strömung $\vec{v}(\vec{r}, t) = v_\varphi(r, t)\hat{\varphi}$ (siehe Serie 8, Aufgabe 2). Löse die Gleichung für die zeitliche Entwicklung aus a) unter Verwendung der Anfangsbedingung $\zeta(\vec{r}, 0) = \zeta_0 \delta(\vec{r})$.

Tipp: Verwende Fouriertransformation.

- c) Verwende nun als Ausgangskonfiguration den Wirbel mit endlicher Ausdehnung aus Serie 8, Aufg. 2b),

$$\zeta(\vec{r}, t) = \zeta_0 \frac{e^{-\frac{r^2}{2a^2}}}{2\pi a^2}.$$